

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата

ПРОСПАН®



Растительный препарат от кашля

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:
ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Проспан® МНН
ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ:
Плюща листьев экстракт
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: раствор для приема внутрь

СОСТАВ

1 мл препарата содержат:

активный компонент: Плюща листьев экстракт сухой, экстрагент - этанол 30 % (5-7,5: 1) - 7,000 мг;

вспомогательные вещества: вода очищенная - 566,66 мг; калия сорбат - 1,34 мг; лимонная кислота безводная - 0,50 мг; сорбитол жидкий кристаллизующийся - 550,00 мг; камедь ксантановая - 1,50 мг; ароматизатор вишневый - 3,00 мг.



ОПИСАНИЕ

Раствор светло-коричневого цвета, слегка мутноватый, с запахом вишни.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие.

Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период лактации

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутрь. Грудным детям (0-1 год) по 2,5 мл 2 раза в день. Маленьким детям (1-6 лет) по 2,5 мл 3 раза в день. Детям школьного возраста и подросткам по 5 мл 3 раза в день. Взрослым по 5 - 7,5 мл 3 раза в день.

Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика.

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением взбалтывать!

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей.

В процессе хранения возможно легкое помутнение раствора для приема внутрь и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Информация для пациентов с сахарным диабетом: 2,5 мл раствора для приема внутрь содержат 0,963 г сорбитола, что соответствует 0,08 хлебной единицы (ХЕ).

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для приема внутрь. По 100 мл или 200 мл во флаконы темного стекла с пробкой-дозатором из полиэтилена низкой плотности, навинчиваемой крышкой с кольцом для контроля первого вскрытия и мерным колпачком. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше +25 °С.
Срок хранения после вскрытия флакона - 6 месяцев.
Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Энгельхард Арцнаймиттель ГмБХ и Ко. КГ.,
Херцбергштрассе, 3, Д-61138
Нидердорфельден, Германия

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ / ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ

ООО «Альпен Фарма»
105082, Москва, Фридриха Энгельса, д.75, стр.10, 3 этаж, каб. 2
тел.: +7(495) 609 65 72
info.russia@alpenpharma.com
www.alpenpharma.ru

Генеральный директор
ООО «Альпен Фарма»



Зудин В.Б.